

5.9.2017
Os. 4
Sellas

**Leikkaus-
kertomus**

Toimenpide-
indikaatio

Potilaalla on todettu L4/5-välin spinaalistenoozi. Tulee sen kirvoitusta varten osastolle. Tässä kesän aikana seurannassa virtsaamisongelmat ovat hieman lieventyneet. Oikea puoli on oireisempi ja siltä puolelta mennään sisälle.

Toimenpide

Decompressio L IV/V (mikroskooppiavusteinen over the top oikealta)

Operatöörit: Laine - Österman - sh
Anestesia: eri kertomus.

Potilas on OSI-pöydällä. Tasomerkkkaus läpivalaisulla. Ihoavaus keskiviivaan. Mennään pitkin L4- ja L5-okahaarakkeita L4/5-interlaminaariväliin oikealle ja pannaan McCullough-levittäjä paikalleen. Ohennetaan Ultrapower-poralla L4-okahaaraketta ja myös hieman L5-okahaarakkeen reunaa kraniaalisesti interspinosusligamentti säilyttäen. Poistetaan poralla L4-laminaa flavumin kiinnittymiskohtaan saakka. Poistetaan stanssilla L5-laminan kraniaalireunaa jonkin verran. Tehdään viisto pikkunivelresektio oikealle taltalla nivelen integriteetti säilyttäen. Poistetaan flavum. Taitetaan hieman L4-okahaaraketta vasemmalle ja poistetaan subartikulaarinen L5-hermojuuren pinteent aiheuttama kudosis oikealta puolelta. Käännetään leikkauspöytä ja mikroskooppia ja tehdään vasemman puolen dekompressio oikealta puolen käsin. Poistetaan flavum sekä L4-laminan sisälamellia että L4/5-pikkunivelen kanavaan päin suuntautuvat osat siis vasemmalta. Neuraaliset elementit vapautuvat ja säilyvät intakteina. Tri Österman sulkee kerroksittain. Dreeniä käytetään.

Diagnoosi

M48.0 Stenosis canalis spinalis lumbalis L IV/V

Timo Laine
ortopedi / TK